

**PRODUCTION COTONNIÈRE DE LA CENTRAFRIQUE EN 1968-1969**

Préfectures et Sous-Préfectures	Production de coton-graine t
<b>M' BOMOU</b>	
Bangassou .....	664
Ouangou .....	740
Bakouma .....	246
Rafai .....	—
	<hr/> 1 650
<b>BASSE-KOTTO</b>	
Alindao .....	3 663
Mobaye .....	1 683
Kembé .....	—
Mingala .....	1 330
	<hr/> 6 676
<b>OUAKA</b>	
Bambari .....	4 383
Grimari .....	2 990
Ippy .....	2 171
Bakala .....	741
Kouango .....	2 747
	<hr/> 13 032
<b>KEMO-GRIBINGUI</b>	
Sibut .....	2 719
Dékoa .....	3 719
Crampel .....	6 123
	<hr/> 12 561
<b>OUHAM</b>	
Bossangoa .....	4 626
Markounda .....	2 461
Bouca .....	2 104
Batangafo .....	2 506
	<hr/> 11 697
<b>OUHAM-PENDE</b>	
Bozoum .....	1 719
Bocaranga .....	3 356
Paoua .....	5 387
	<hr/> 10 462
<b>NANA-MANBERE</b>	
Bouar-Baboua .....	1 418
<b>BAMINGUI-BANGORAN</b>	
N'Délé .....	267
<b>Total R.C.A.</b> .....	<hr/> 57 763

**INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION COTONNIÈRE EN U.R.S.S.**

(Traducteur : M. SERGUEEFF)

*Doses annuelles moyennes d'engrais chimiques apportées au cotonnier en 1965-1967 dans les différentes régions d'Azerbaïdjan*

Régions de la République	Doses moyennes annuelles kg/ha (principe actif)	
Agdjabedinsky	72,4	60,5
Bardinsky	55,6	53,3
Idanovsky	66,0	53,7
Kassoum-Ismaïlovsky	74,2	79,0
Sabirabadsky	85,1	59,4
Moyenne pour la République	77,5	65,0

*Production du cotonnier (kg/ha) suivant les doses d'engrais azotés apportées au sol. Expérience de la station de Boukhara (Ouzb.) (Khlop., 7-1969, p. 15)*

Variantes	Composition physique de la terre					
	argileuse		moyennement argileuse		sablonneuse	
	1963	1964	1965	1966	1967	1968
P 100	2 340	2 180	2 480	2 160	3 340	3 360
N 100 - P 100	2 850	2 590	3 220	3 090	4 720	3 860
N 150 - P 100	2 990	2 690	3 530	3 310	5 100	4 140
N 200 - P 100	3 170	2 940	3 700	3 500	5 440	4 520

*Production du cotonnier dans les kolkhozes du département de Tachkent suivant le pourcentage de culture de luzerne dans l'assolement (Khlop., 1969, 6, 17).*

Nombre de kolkhozes dans chaque groupe	Pourcentage de luzerne dans l'assolement du groupe %	Production du cotonnier kg/ha
29	6,4	2 650
38	10,0	2 740
18	11,9	2 720
4	18,6	3 220

*Influence des engrais azotés sur la production du cotonnier (kg/ha) suivant le régime d'irrigation (Khlop., 1969, 7, 15)*

Doses d'engrais	Schéma d'irrigation			
	60 - 70 - 60 (1)		70 - 75 - 60	
	1967	1968	1967	1968
P 100 (fond) .....	2 830	3 250	3 720	3 380
Fond + N 100 .....	3 390	3 670	5 200	3 860
Fond + N 200 .....	3 850	3 900	5 440	4 520

(1) Humidités du sol (en % de sa capacité) au moment des irrigations : avant la floraison, pendant la floraison et pendant la maturation.